

آپتامرها و کاربردهای بیولوژیکی - درمانی آن‌ها

سیدمصطفی حسینی ذیجود^۱؛ صادق زارعی^۲؛ حسن قاسمی^۱؛ مهدی محمودی^۳؛ رقیه عباسعلی پورکبیر^{۲*}

چکیده

آپتامرها توالی‌های تک رشته‌ای سنتزی RNA یا DNA (اخیراً، پتیدی) هستند که به ساختارهای دوم و سوم فولد می‌شوند و با اختصاصیت فوق‌العاده زیاد به اهداف معینی متصل می‌گردند. اولین بار آپتامرها در سال ۱۹۹۰ ارائه شدند، خصوصیات بی نظیر آنها باعث شده موثرتر از آنتی‌بادیها عمل نمایند. آپتامرها عموماً از طریق فرایند آزمایشگاهی Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment (SELEX) (از یونهای معدنی کوچک تا سلولهای کامل) متصل شوند. آپتامرها، زمانی که انتخاب شدند، طی فرایند (Polymerase chain Reaction) تکثیر شده تا مقادیر زیادی از آنها با خلوص بالا تهیه شود. ساختار شیمیایی ساده آپتامرها آنها را پذیرای اصلاحات کاربردی بیشتر با توجه به هدف‌های مختلف می‌نماید. بالاخره آپتامرها بسیار پایدارتر از آنتی‌بادیها هستند که آنها را مناسب و سازگار برای شرایط دشوار (مثل بالا بودن دما) می‌نماید. مطالعات و کشفهای روبه‌رشدی در زمینه کاربردهای آپتامرها همانند تشخیص و درمان در حال انجام است. احتمالاً در آینده ای نزدیک آپتامرها استفاده فزاینده‌ای هماهنگ با دیگر مولکولهای درمانی پیدا کند.

در مقاله مروری حاضر دلایلی که چرا آپتامرها جایگزین مناسبی برای آنتی‌بادیها هستند بیان شده است. علاوه بر کاربردهای آپتامرها مانند ابزار تشخیصی، درمانی، تصویربرداری زیستی و تحویل دارو معرفی شده است. در ادامه چندین نوع از فرایندهای انتخاب *in vitro* با جزئیات توصیف گردیده است.

کلمات کلیدی: آپتامر، آنتی‌بادی، سیستم تحویل دارو، Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment (SELEX).

۱. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲. دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

۳. دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

* عهده‌دار مکاتبات:

Email: abbasalipourkibir@yahoo.com

مقدمه


مفاهیم اتصال نوکلئیک اسیدها با پروتئین‌ها در دهه ۱۹۸۰ با تحقیق روی ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) و آدنوویروس آغاز شد. این ویروسها تعدادی RNA کوچک را کد می‌کنند که به پروتئینهای سلولی یا ویروسی با تمایل و اختصاصیت بالا متصل می‌شوند. در مورد HIV یک لیگاند کوتاه از جنس RNA بنام عنصر

آپتامرها، الیگونوکلئوتیدهایی از جنس مولکولهای تک رشته ای RNA و ssDNA یا مولکولهای پتیدی هستند که به‌علت ساختار سه بعدی خاصشان می‌توانند با اختصاصیت و تمایل بالا به اهدافشان متصل شوند (۱).

پروتئین در دسترس نیست یا زمانیکه هدف مورد نظر یک دومن یا سایت خاص پروتئین است، تکه‌ها یا دومین‌های پروتئینی یا پپتیدی نیز می‌تواند برای ایجاد آپتامر بکار روند. اولین گزارش در مورد آپتامر پپتیدی در سال ۱۹۹۶ ارائه شد که آپتامرهای پپتیدی اپی-توپ‌های مختلف سطحی کینازهای وابسته به سیکلین ۲ را شناسایی نمودند (۱۰). در مقایسه با آپتامر DNA/RNA، آپتامرهای پپتیدی هنوز در ابتدای راه هستند.

آپتامرهای پیشرفته بطور اولیه بعنوان ابزار درمانی و تشخیصی مطرح شدند. آغاز استفاده از آپتامرها بعنوان درمان در سال ۱۹۹۰ بود، اما ۱۵ سال طول کشید تا اولین آپتامر درمانی به بهره برداری بالینی برسد. تاکنون Macugen تنها آپتامر دارویی تایید شده توسط سازمان غذا و دارو (FDA) بوده که در سال ۲۰۰۴ به بازار عرضه گردیده است. Macugen یک آپتامر اختصاصی فاکتور رشد اندوتلیال رگی (VEGF) برای درمان neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD) است (۱۱). در حال حاضر آپتامرها برای درمان ماکولار دجنریشن (macular degeneration)، سندرم کروئری حاد، اختلال مربوط به فاکتور ون ویلبراند، سندرم ون هیپل لیندا، انژیوماس، لوکمی میلوئید حاد، سرطان سلول کلیوی، سرطان ریه، پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک، دیابت نوع ۲، نفروپاتی، لوپوس و همچنین آپتامرهایی علیه ویروسها در مراحل مختلف توسعه و بالین هستند، بنابراین آینده روشنی برای آپتامرها بعنوان عوامل درمانی در پیش است (۱). تکنولوژی آپتامر بعنوان یک تکنولوژی معتبر و موثر گسترش یافته و مطالعات زیادی از کاربردهای آپتامرها انجام گرفته است و امروزه آپتامرها در جنبه های مختلف بعنوان یک ابزار تشخیصی و درمانی، در گسترش داروهای جدید و سیستمهای تحویل دارو و غیره بکار می‌روند (۱) (شکل-۱).

شکل ۱: کاربردهای مختلف آپتامرها



TAR (trans-activation response) همانندسازی ویروسی را با اتصال به پروتئین Tat ویروسی ترغیب میکند (۲). آدنوویروس نیز یک آپتامر RNA ای کوتاه (VA-RNA) دارد که ترجمه را تنظیم می‌نماید (۳). مطالعات معتبر فراوانی روی آپتامرها انجام گرفت تا اینکه فرایند انتخاب در محیط آزمایشگاه (in vitro) اولین بار در سال ۱۹۹۰ توسط گروه محققین Gold و گروه Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment (SELEX) نامیده شد (۴، ۵). با گسترش SELEX که امروزه یک تکنیک پایه‌ایی برای جداسازی آپتامرهاست، بسیاری از آپتامرها مستقیماً بصورت in vitro علیه اهداف مختلف از بیومولکولهای کوچک گرفته تا پروتئینها و حتی سلولها انتخاب می‌گردند (۶).

امروزه آپتامرها در دو کلاس عمده آپتامرهای DNA/RNA و آپتامرهای پپتیدی تقسیم بندی میشوند. آپتامرهای DNA/RNA الیگونوکلئوتیدهای تک رشته‌ای با وزن مولکولی ۴۰-۵۰ کیلودالتون هستند که میتوانند به ساختارهای سه بعدی مناسب فولد شده و به مولکولهای هدف با اختصاصیت و تمایل بالا متصل شوند. کتابخانه مولکولهای RNA تک رشته‌ایی با رونویسی in vitro از الگوی DNA دو رشته‌ای با استفاده از RNA پلی مراز T7 نو ترکیب تهیه میشود و کتابخانه DNA تک رشته‌ای اغلب با جداسازی محصولات دو رشته‌ای PCR تهیه می‌گردد (۷). DNA آپتامرها پایداری بیشتری از RNA آپتامرها داشته و معمولا ساختار G-Quartet دارند، از طرفی انعطاف پذیری RNA آپتامرها برای فولدهای مناسب بیشتر است.

آپتامرهای پپتیدی، از یک لوپ پپتیدی متغیر که در انتها به یک داربست پروتئینی اتصال دارد تشکیل شده است (۹). این لوپ متغیر معمولا از ۱۰ تا ۲۰ اسیدآمینو تشکیل شده، در حالیکه داربست پروتئینی میتواند هر پروتئینی با حلالیت مناسب باشد. در مواردی که کل

مقایسه آپتامر با آنتی بادی

استفاده از آنتی بادیها بعنوان معروفترین دسته مولکولها برای تشخیص مولکولی در طیفی وسیع، برای بیش از سه دهه کاربرد داشته است. آپتامرها با سرعت و بطور گسترده جانشین آنتی بادیها شدند، زیرا این مولکولها نقایص آنتی بادی را نداشتند. مزایای آپتامرها در مقایسه با آنتی بادی در ذیل آورده شده و در جدول ۱ نیز اشاره گردیده است (۶).

پایداری بالای آپتامرها: واضح است که پروتئین به آسانی در دماهای بالا ساختار سوم خود را از دست داده و دناتوره می شود، درحالیکه الیگونوکلوئوتیدها در این شرایط پایدار بوده و حتی ساختارهای خود را طی چرخه های متعدد دناتوره/رناتوره حفظ میکنند. بنابراین مهمترین فایده آپتامرهای الیگونوکلوئوتیدی نسبت به آنتی بادی های پروتئینی پایداری آنها در دمای بالاست. آپتامرها بعد از کاهش دما می توانند ساختار طبیعی خود را بدست آورده و با اختصاصیت به اهداف متصل شوند، در حالیکه آنتی بادیها دچار دناتوراسیون غیرقابل برگشت می شوند (۱۲). بنابراین آپتامرها در شرایط مختلف سنجش می تواند مورد استفاده قرار گیرند.

تولید آپتامرها (سنتز/اصلاح): شناسایی و تولید آنتی بادی مونوکلونال فرایند بسیار وقت گیر و گرانی محسوب می شود که مستلزم غربالگری تعداد زیادی کلونی می باشد. به علاوه موفقیت بالینی آنتی بادیها نیاز ضروری برای تولید انبوه با هزینه های گزاف در کشت سلولی پستانداران را ایجاد می نماید (۱۳). از طرفی سنجش های ایمنی برای تایید فعالیت آنتی بادیها در هر دسته (batch) الزامی است، زیرا یک آنتی بادی با توجه به دسته، عملکرد متفاوتی خواهد داشت. در حالی که آپتامرها زمانیکه انتخاب شوند می توان آنها را در مقادیر بالا و با دقت و تکرار پذیری فراوان توسط واکنش شیمیایی سنتز نمود. این فرایندهای شیمیایی ارزاتر از تولید آنتی بادیها مونوکلونال خواهد بود، بعلاوه آپتامرها برآحتی با واکنش

های شیمیایی متنوع قابل اصلاح هستند تا پایداری و مقاومت در برابر نوکلئازها در آنها افزایش یابد (۱۴، ۱۵). ایمنی زایی پائین آپتامرها: آپتامرها معمولا مولکولهایی با سمیت و ایمنی زایی پائین هستند. چون نوکلئیک اسیدها توسط سیستم ایمنی انسان بعنوان عوامل خارجی شناسایی و تلقی نمیشود، در حالیکه آنتی بادیها بسیار ایمنی زا بوده که مانع تکرار تجویز می شوند (۱۶). در سال ۲۰۰۲ نشان داده شد که آپتامر اختصاصی VEGF ارائه شده به میمونها با دوزهای بسیار بالاتر، ایمنی زایی پائینی ایجاد می کند (۱۷).

تنوع هدف: از میان مولکولهایی که پاسخ ایمنی قوی ایجاد نمی کنند، شناسایی و تولید آنتی بادی ها دشوار است، اما آپتامرها در تعداد و مقادیر کافی قابل تولید هستند. بعلاوه آپتامرها اختصاصیت و تمایل بالایی برای برخی لیگاندها مانند یونها و مولکولهای کوچک نشان می دهند که به هیچ وجه توسط آنتی بادی ها شناسایی نمی شوند، بنابراین آپتامرها می توانند بعنوان اجزا تشخیصی با کاربردهای وسیع در زمینه بیوسنسرها بکار گرفته شوند (۱۵).

براساس فوایدی که ذکر شد آپتامرها بعنوان گزینه مناسب در بسیاری کاربردهای بیولوژیک جایگزین آنتی بادیها هستند. البته ناگفته نماند که آپتامرها محدودیتهایی نیز دارند (۱۸) که در جدول ۱ تا حدودی به آن اشاره شده است.

کاربردهای بیولوژیکی و درمانی آپتامرها

کاربردهای آپتامرها در زمینه درمان:

در این بخش به آپتامرهایی که در حیطه درمان وارد شده اند و در فازهای مختلف بالینی هستند اشاره می شود، برای مطالعات تکمیلی میتوان به منابع مراجعه نمود. همانطور که گفته شد Macugen توسط Pfizer و Eyetech ابداع گردید که هم اکنون بطور تجاری برای درمان AMD در دسترس است. این داروی آپتامری کانزوگه با پلی اتیلن گلیکول، نوکلئیک اسید تک رشته

گسترش داروهای جدید نیز به کندی پیش می رود. از دلایل این امر میتوان به جذب ضعیف، سرعت بالای متابولیسم و حذف داروهای دهانی که منجر به حلالیت کم دارو و غلظتهای کم یا متغیر آن در خون میگردد، اشاره نمود. دسترسی زیستی غیرقابل پیش بینی داروهای دهانی بعلت سمیت غذایی و بافتی از علل دیگر است. بنابراین روشهای نوین ارائه دارو مانند سیستم مناسب حامل دارو برای غلبه بر این مشکل لازمست. هدف یابی بافتها و ارگانهای بیمار بدن یکی از مهمترین چالشهای سیستمهای تحویل دارو است (۳۲، ۳۳). هدف عمده سیستمهای جدید تحویل دارو بهبود کارایی ضدتوموری دارو و کاهش اثرات سمی آنها بر بافتهای نرمال می باشد. برای مثال تاموکسیفن بعنوان یک مولکول آنتی استروژن و داروی هیدروفوب قوی به تازگی به فرم کپسول در سیستم تحویل داروی کولوئیدی درآمده و بر غده توموری پستانی القا شده در موش با تزریق داخل صفاقی موثر بوده است (۳۴، ۳۵).

سیستم دیگر که اخیراً برای تحویل داروها به داخل سلولها مورد بهره برداری قرار گرفته اند آپتامرهای می باشند که به گیرنده های سطحی سلول متصل شده و بداخل سلول کشیده می شوند. siRNA ها امروزه بعنوان کلاس جدیدی از درمانها برای بیماری های مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. نقش siRNA القا مسیر RNAi است که بیان یک ژن خاص را تنظیم می کند. تحویل امن، اختصاصی و کارای siRNA بداخل سلولهای خاص برای اهداف درمانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. گروه محققین Levy یک کونژوگه آپتامر-siRNA را از طریق پل واسطه استرپتوآویدین با استفاده از یک آپتامر Anti-PSMA برای سلولهای سرطان پروستات (LNCaP) معرفی نمودند (۳۶). این کونژوگه بداخل سلولهای LNCaP طی سی دقیقه اضافه شده و مهار بیان ژن بواسطه siRNA بطور موثر مشاهده گردید. PSMA (آنتی ژن غشایی اختصاصی پروستات) مارکر مهم سرطان پروستات است (۳۱).

ایی با اختصاصیت برای VEGF 165 است که نقش حیاتی در رگ زایی و نفوذپذیری دارد (۱۹).

REG1 بعنوان داروی آپتامری جدید با خاصیت ضدانعقادی ابداع گردید. این داروی آپتامری در فاز ۲ سنجش بالینی است. REG1 از ۲ جز RB006 (آپتامر اختصاصی فاکتور انعقادی ۹) و RB007 (آنتی دوت الیگونوکلوئیدی آپتامر RB006) تشکیل شده است (۲۰). RB006 یک آپتامر ۲ ریوپسورین/۲ فلوروپیریمیدینی است که به پلی اتیلن گلیکول ۴۰ کیلودالتونی کونژوگه شده تا آپتامر را علیه تجزیه شدن توسط نوکلئاز حفاظت کند.

بسیاری از داروهای مبتنی بر آپتامر از قبیل AS1411 (یک آپتامر اختصاصی نوکلئین) برای لوکمی حاد میلوئید، ARC1779 (یک آپتامر اختصاصی فاکتور ون ویلراند) برای بیماری شریان کاروتید و NU172 (یک آپتامر اختصاصی ترومبین) برای ضد انعقاد در مراحل مختلف سنجش های بالینی هستند (۲۱-۲۷). لیستی از این آپتامرهای درمانی در جدول ۲ آمده است.

مصرف in vivo آپتامرها کاملاً وابسته به موقعیت مولکول هدف است. برای هدفهای خارج سلولی براحتی میتوان با مداخله رگی آپتامر را تحویل داد، مانند آپتامرهای درمانی علیه پروتئینهای ویروسی (۲۸)، فاکتورهای رشد (۲۹)، هورمونها (۳۱)، مولکولهای التهابی (۸) و فاکتورهای انعقادی (۳۳). از طرفی بسیاری از آپتامرها علیه اهداف داخل سلولی که اکثر پروتئینها و تا حدی نوکلئیک اسیدها در پاتولوژی مختلف هستند تولید شده اند (۳۰). برخی آپتامرها هم فقط به هدفهایی که در غشای سلول قرار گرفته اند مانند آنتی ژنهای غشایی گلیکوپروتئینهای گیرنده تیروزین کینازی و غیره متصل میشوند (۳۱).

کاربرد آپتامرها در سیستم تحویل دارو:

از مشکلات عمده در شیمی درمانی برخی سرطانها، میتوان به انواع مختلفی از مقاومت دارویی، سمیت دارویی و تعاملات ناخواسته دارویی اشاره نمود. روند

و نیاز به معرف های زیاد و نیز دو نوع آنتی بادی دارد. امروزه شرکت های زیادی وجود دارند که آنتی بادی های اختصاصی علیه ده ها هزار پروتئین مختلف فراهم نموده اند. گروه Hah یک استراتژی وسترن بلات جدید مبتنی بر آنتامر طراحی کرده اند که کل فرایند را به یک مرحله کاهش داده است و به آسانی پروتئین هدف را با استفاده از یک آنتامر تشخیص می دهد. به جای ۲ نوع آنتی بادی، آنتامر RNA یی کونژوگه با QD اختصاصی برای His-Tag بکار گرفته شد. این روش مزایای زیادی همچون کم شدن زمان فرایند، عدم نیاز به آنتی بادی یا p۳۲ دارد که امکان تشخیص های پیچیده را فراهم می کند (۴۰).

کاربرد آنتامرها در کروماتوگرافی تمایلی:

کروماتوگرافی تمایلی بعنوان یک تکنیک رایج آزمایشگاهی در بسیاری زمینه های تخصصی کاربرد دارد که متکی بر تعامل بین یک آنتی ژن و یک آنتی بادی برای تخلیص پروتئین های هدف است. استفاده از یک آنتامر در کروماتوگرافی مزیت های زیادی نسبت به آنتی بادی دارد، از جمله می توان تمایل و اختصاصیت بالاتر به هدف، اندازه کوچکتر، تثبیت و اصلاح دقیقتر، پایداری بهتر، تکرارپذیری بیشتر نام برد. گروه Drolet یک سیستم کروماتوگرافی تمایلی آنتامر برای L-سلکتین انسانی ابداع نمودند. پروتئین نو ترکیب تلقیحی ایمونوگلوبین-L سلکتین انسانی بطور موفقیت آمیز از محیط کشت سلولی تخمدان همستر چینی با استفاده از ستون تمایلی آنتامر تخلیص شد (۴۱).

بعلاوه گروه Le یک کروماتوگرافی تمایلی ساندویچی آنتامر با استفاده از دو آنتامر که اختصاصیت و انتخاب پذیری بالاتری برای ترومبین داشت ابداع نمودند (۴۲).

کاربرد آنتامرها در ALISA :

الایزا یکی از تست های تشخیصی بالینی رایج، برای تشخیص تقریباً هر پپتید یا پروتئینی با اختصاصیت بالا است. در یک نوع از الایزا معروف به ساندویچ، همزمان از دو آنتی بادی یا پروتئین گیرنده متصل شونده به آنالیت

کاربرد آنتامرها در تصویربرداری زیستی (Bioimaging):

کاربرد دیگر آنتامر تصویربرداری زیستی است، استفاده از آنتامر کونژوگه شده با فلورفور، QD (quantum dot) یا دیگر مواد مانند گادولینیوم، برای MRI مفید است. استفاده از آنتامرها بعنوان عوامل تصویربرداری مزیت غیر سمی بودن را دارد، چون الیگونوکلئوتیدها بطور طبیعی در بدن انسان وجود دارند. بعلاوه چون آنتامرها اختصاصیت بالایی برای اهدافشان دارند (هدف یابی دقیق) و سرعت در جریان خون منتشر می شوند، استفاده از این مولکولها میتواند اعتبار نتایج حاصله طی آنالیزهای بالینی یا تشخیصی را افزایش دهد. بر اساس این فواید آنتامرها بعنوان عوامل تصویربرداری برای تصویربرداری سلول و برای تصویربرداری پروتئین منفرد در حال بررسی هستند (۳۷).

گروه Kim نتایج تصویربرداری سلول C6 را با استفاده از آنتامر AS1411 نشاندار با Cy3 که حاوی یک اصلاح شیمیایی ۵-(N-بنزیل کربوکسامید)-۲ داکسی یوریدین روی باز تیمیدین است را گزارش کردند (۳۸). آنتامر AS1411 برای پروتئین ترانس ممبران نوکلئین در سلول های سرطانی اختصاصی است. گروه Kim تمایل اتصال آنتامر به هدفش را از طریق اصلاح شیمیایی ارتقا دادند. تصویربرداری سلول توسط آنتامر اصلاح شده AS1411 نشاندار با cy3 برای سلول های C3 نسبت به آنتامر اولیه (AS1411 نشاندار با Cy3 که اصلاح نشده) کارا تر است.

علاوه بر این موارد، یک آنتامر اختصاصی برای p68 در تومورهای کبد و یک آنتامر اختصاصی برای سلول های سرطان ریه (SCLC) بعنوان پروب بالقوه تصویربرداری زیستی معرفی گردیده است (۳۷، ۳۹).

کاربرد آنتامرها در آنالیز وسترن بلات:


آنالیز وسترن بلات یک تکنیک آنالیتیکی رایج است که برای کمی سازی پروتئین های خاص بکار می رود. فرایند این تکنیک شامل مراحل سخت و پیچیده ای است

خانواده‌های پروتئینی مانند سیتوکینها، پروتازها، کینازها، گیرنده های سطح سلولی و مولکولهای چسبان سلولی شناسایی نموده اند (۷, ۱۸, ۴۶).

همانطور که گفته شد SELEX یا انتخاب *in vitro* تکنیکی است که برای جداسازی آپتامرها با تمایل بالا برای یک هدف معین از کتابخانه‌ای حاوی حدود ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۵ الیگونوکلئوتید ترکیبی بکار می رود. فرایند SELEX متشکل از سه مرحله است که تکرار میشود تا نوکلئوتیدهای که بهتر به هدف متصل میشوند جستجو و یافت شوند (شکل ۲)(۴۷).

مرحله اول (ایجاد کتابخانه) است، یک کتابخانه حاوی نوکلئوتیدهای تک رشته‌ای که متشکل از مناطق توالی رندم معمولا ۴۰-۳۰ نوکلئوتیدی و ختم شده به جایگاه اتصال پرایمر می باشد. در مرحله دوم (اتصال و جداسازی) اجزای کتابخانه‌ای متصل به هدف از اجزای غیر متصل جدا می شوند، معمولا این مرحله با چندین روش دیگر همراه است تا انتخاب هدف یا کتابخانه آسان و سریع انجام گیرد. در پایان، در مرحله سوم (تکثیر) اجزای متصل به هدف کتابخانه با PCR تکثیر شده تا یک کتابخانه جدید برای استفاده در دور بعد ایجاد شود. این مراحل ۱۰ تا ۱۵ مرتبه تکرار می شود تا آپتامرها گسترش یافته و خصوصیاتشان توسط سنجش های بیولوژیکی متنوع شناسایی شود.

شکل ۲: تصویری از سه مرحله فرایند SELEX.



برای تشخیص آنالیت یا هدف استفاده می شود. aptamer-linked immobilized sorbent assay (ALISA) توسط گروه Kiel معرفی گردید که در این سنجش از آپتامرها استفاده گردید. آنها در مطالعه‌ای مقایسه دو روش ELISA و ALISA را انجام دادند. قابل ذکر است که آپتامرها محدودیتهای آنتی بادیها را ندارند (۲۰).

مطالبی که در بالا ذکر شد از زمینه هایی است که آپتامرها در آن وارد شده و بکار گرفته شده است. مطالعات در این زمینه ها به سرعت در حال پیشرفت است اما با این وجود چالشهایی پیش روی آپتامرها وجود دارد.

فرایند Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment (SELEX):

تولید آپتامر برای اهداف درمانی طی چندین مرحله انجام میگردد. نوکلئیک اسیدهای بیولوژیکی می توانند با یکدیگر بر اساس یک کد ساده هیبرید شوند و اشکال پیچیده‌ای را بعنوان داربست برای تعاملات مولکولی و تشکیل کمپلکس با پروتئین‌ها و دیگر اهداف کوچک مولکول فراهم آورند (۴۳, ۴۴). به تازگی پیشرفت‌های تکنولوژی زمینه ابداع روشهای تکاملی *in vitro* برای کشف الیگونوکلئوتیدهای غیربیولوژیکی که بتواند به اهداف پروتئینی متصل شود را فراهم نموده است. پیشرفت در روشهای صنعتی سنتز DNA، تولید مقادیر زیاد الیگوداکسی نوکلئوتیدها را میسر ساخته است. تکنیک PCR اجازه تکثیر مقدار کم مولکولها به مقادیری که به آسانی دستکاری شود را فراهم نموده است، زمانیکه این پیشرفتها با هم همراه شدند SELEX ابداع گردید. لیگاند‌های نوکلئیک اسیدی که با SELEX تولید شدند آپتامر نامیده شد. آپتامر از لغت لاتین Aptus به معنای Fit to گرفته شده است (۴۵). آپتامرها از معدود گروه مولکولها هستند که می توانند به اهداف مختلف متصل شوند. از زمان ابداع SELEX در سال ۱۹۹۰ محققان آپتامرهایی با تمایل بالا برای اهداف متنوع

انواع SELEX

SELEX مبتنی بر فیلتراسیون غشای نیتروسلولوزی: غشای نیتروسلولوزی معمولاً برای تثبیت پروتئین‌ها در وسترن بلات و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بکار می‌رود، که تثبیت آسان و سریع پروتئین‌ها با تمایل غیراختصاصی برای اسیدهای آمینه را فراهم می‌کند. در سال ۱۹۶۸ یک روش با استفاده از غشا نیتروسلولوزی توسط گروه Kramlova برای جداسازی سریع یک پروتئین از مولکولهای RNA بکار گرفته شد (۴۸). این روش بعنوان یک ابزار تحقیقاتی برای جداسازی پروتئین‌ها از دیگر اجزا و برای تثبیت پروتئین‌ها می‌باشد که می‌تواند با دیگر بیومولکولها واکنش دهد. زمانیکه روش SELEX اولین بار توسط گروه Gold ابداع شد آپتامر علیه DNA پلیمرز T4 با استفاده از استراتژی که مبتنی بر غشا نیتروسلولوزی بود بدست آمد. چون اهداف در مراحل اولیه SELEX پروتئینی بودند یک غشا سلولوزی طی مرحله جداسازی بکار گرفته شد. این غشاها برخی محدودیتها از قبیل ناتوان بودن در اتصال به پپتیدها و مولکولهای کوچک را داشتند.

SELEX مبتنی بر کروماتوگرافی تمایلی:

کروماتوگرافی تمایلی روشی برای جداسازی اجزا از یک مخلوط بیوشیمیایی است. این تکنیک ابتدا برای تخریب پروتئینهای نو ترکیب براساس تعاملات بیولوژیکی اختصاصی بالا (مانند تعامل بین یک لیگاند و گیرنده یا یک آنتی‌بادی و آنتی‌ژن) بکار رفت. فاز ثابت معمولاً از دانه‌های آگارز تشکیل شده و این دانه‌ها داخل یک ستون برای فرایندهای شستشو پک شده‌اند. کروماتوگرافی تمایلی در مراحل اتصال و جداسازی SELEX، در انتخاب اجزای کتابخانه‌ایی که برای هدف تمایل دارند با تثبیت مولکولهای هدف روی دانه‌ها مشارکت می‌کند. در مورد تثبیت پروتئینها، برچسب‌های مختلف مانند گلوکاتیون S-ترانسفراز و هیستیدین بکار می‌رود و در مورد مولکولهای آلی کوچک اهداف بطور کووالانسی از طریق یک واکنش شیمیایی مانند کوپل

شدن با EDC روی دانه‌ها تثبیت می‌شوند (۴۹). بنابراین SELEX برای مولکولهای کوچک مانند پروتئینها می‌تواند از این روش بهره‌بردار، چندین آپتامر با استفاده از این روش انتخاب شده‌اند (۵۰، ۵۱). اگرچه ایراد این روش اینست که نمیتوان برای اهدافی که تمایل کمی دارند و یا در مواردیکه گروه کاربردی برای کوپل شدن به دانه‌ها ضروریست، مورد استفاده قرار گیرند.

SELEX مبتنی بر الکتروفورز موئینه‌ای (CE):

الکتروفورز موئینه‌ای دارای چندین مزیت نسبت به روشهای جداسازی آنالیتیکی است. در این روش سرعت جداسازی و ظرفیت بالاست و کمترین رقت نمونه مورد نیاز است. این روش می‌تواند نمونه‌های یونی را با توجه به بار و شعاع هیدرودینامیک آنها در یک میدان الکتریکی جدا نماید (۵۲). با این روش می‌توان یک آپتامر را با توجه به میزان حرکتش در مخلوطی از هدف، کتابخانه و کمپلکس هدف-کتابخانه جدا نمود. مهمترین مزیت این روش اینست که انتخاب موفقیت آمیز آپتامر طی چند دور کوتاه، عموماً ۴-۲ دور انجام پذیر است، در صورتیکه در روشهای دیگر این دورها بیشتر است. گروه Bowser آپتامرهایی را برای نوروپپتید Y و IgE انسانی بعد از تنها ۴ دور انتخاب بدست آوردند (۵۳).

SELEX سلولی:

هدف این مورد، یافتن آپتامر علیه کل سلول می‌باشد، در حالیکه اهداف اولیه دیگر روشهای SELEX پروتئینهای منفرد تخریب شده است. بعبارت دیگر اهداف SELEX سلولی، پروتئینهای خارج سلولی سطح سلول یا ساختار خاص سلول است. در اکثر موارد فرایندهای SELEX سلولی مراحل شستشو (برای سلولهای چسبان) یا ساترفیوژ (برای سلولهای سوسپانسیون) طی جداسازی آپتامرها وجود دارد، چون تثبیت هدف در فاز جامد عملی نیست. آپتامرهای حاصله که انتخاب می‌شوند برای تشخیص اختصاصی سلول، تحویل دارویی به سلول هدف و سلول درمانی اختصاصی قدرتمند و کارا

سلولی عبور نمی کنند. بنابراین بسیاری از قوانین که توسط شیمییدان‌های پزشکی طی ساخت و طراحی دارو بکار می روند قابل تعمیم به آپتامرها نیست. بسیاری اهداف آپتامرهای درمانی یا محلول در پلاسمای خون هستند یا در سطح سلول قرار گرفته اند که در هر حال در معرض پلاسمای خون اند و آپتامرها در این محیط ها، هدف تجزیه شدن توسط نوکلئاز سرمی، فیلتراسیون کلیوی و جذب توسط کبد و دیگر بافتها مثل طحال هستند.

آپتامرهای درمانی با روشهای داخل وریدی یا زیرپوستی به بدن ارائه میشود. بر اساس کارهای اولیه در مورد الیگونوکلئوتیدها مسیریابی مثل تنفس، موکوز، پوستی نیز مسیر است اما تاکنون این روشها برای آپتامر استفاده نشده است. اهداف اکثر آپتامرهای درمانی، پروتئین های سطحی سلول هستند که در خون، مایع منی یا مایع میان بافتی حضور دارند و بنابراین آپتامرها مستلزم بقا در این بخشها برای مدتی طولانی تر هستند. در این محیط ها آپتامرها تحت تاثیر تجزیه شدن با نوکلئازها و فیلتراسیون سریع کلیوی و توزیع سریع از اجزای پلاسمایی بداخل بافتها هستند (۶۰). این موانع در مورد همه دسته‌های الیگونوکلئوتیدها صادق است و علاوه بر آن، چالشهای اختصاصی برای هر کلاس نیز وجود دارد. بنابراین برای اینکه آپتامر درمانی موثر باشد باید پایداری ساختارش افزایش و میزان کلیرانس کلیوی آن کاهش یابد.

جرم مولکولی یک آپتامر ۱۵-۵ کیلودالتون است. اگرچه وزن مولکولی پایین، سنتز شیمیایی آپتامر را اختصاصی تر کرده و از طرفی دستیابی به هدف را آسانتر نموده اما این وزن مولکولی کم باعث حذف سریع آپتامر از بدن توسط کلیرانس کلیوی میگردد. برای افزایش دسترسی زیستی آپتامر میتوان وزن مولکولی آن را بالا برد. برای این کار میتوان آپتامرها را با کلاسترول یا پلی اتیلین گلیکول (PEG) کوئزوگه نمود. از این استراتژی

هستند. اخیرا گروه Kobatake یک آپتامر DNAیی برای SBC3 (رده سلولی سرطان ریه از سلولهای چسبان (SCLC)) با استفاده از SELEX سلولی شناسایی کرده اند (۵۵). در سال ۲۰۰۳ گروه Gold با فرایند SELEX سلولی یک آپتامر GBI-10 برای رده سلولی U251 (مشتق از گلیوبلاستوما انسانی) جدا نمودند. مشخص شد که یک پارتنر اتصالی که با آپتامر GBI-10 تعامل می کند پروتئین تناسین C روی سطح سلول است (۵۶).

روشهای دیگر:

چندین روش از قبیل SELEX مبتنی بر میکروفلوئیدیک (Microfluidic), AFM, electrophoretic mobility shift assays (EMSA), surface Plasmon resonance (SPR) شناسایی شده است (۲۸, ۵۷-۵۹). اگرچه این استراتژیها مزیت کم بودن تعداد دورها را دارند اما موثر بودن این روشها در انتخاب آپتامرها بطور واضح مشخص نشده است.

چالشهای پیش روی آپتامر درمانی

در کنار مزیتهایی که برای آپتامر ذکر شد، این گروه از مولکولها دارای محدودیتهایی نیز هستند (جدول-۱). اگرچه انتخاب آپتامرها بعنوان ابزار درمانی با سرعت رو به افزایش است اما سازگاری آپتامرها برای استفاده در vivo نیاز به تحقیقات گسترده دارد. ویژگی‌های بسیاری از پروتئین های درمانی را می توان بر اساس خصوصیات پروتئینهای گردشی شناخته شده، پیش بینی کرد. بعنوان مثال آنتی بادی‌های درمانی تمایل به داشتن نیمه عمر طولانی دارند چون جرم مولکولی بزرگی دارند. با این وجود نوکلئیک اسیدهای کمی در گردش خون وجود دارند که بتواند از مقایسه آنها ویژگیهای آپتامرهای درمانی را پیش‌گویی کرد. از طرفی چون آپتامرها مواد شیمیایی هستند نسبت به داروهای غیرپروتئینی سنتی بزرگترند و به راحتی از موانع بیولوژیکی مانند غشاهای

(۱۶، ۶۱). بعد از اینکه آپتامر بهینه و آماده برای مصرف بالین گردید، باید خصوصیات دارویی و سمیت آن بررسی شود که بیشتر بستگی به بیولوژی هدف، مسیر و نحوه تزریق دارد. در این فرایند یکی از معضلات تحویل اختصاصی جایگاه است. برای اینکه این تحویل اختصاصی انجام گیرد معمولاً از یک وکتور رتروویروس بیان کننده آپتامر استفاده میکنند (۱۶).

نتیجه گیری

در این مقاله مروری، آپتامرها، فواید و کاربردهایشان با معرفی چند نمونه بیان گردید. آپتامر یک جایگزین مناسب برای آنتی بادی است و تحت شرایط گرما و دشوار بسیار پایدار است، چون آپتامرها الیگونوکلیتیک اسید هستند و به آسانی می توانند در مقادیر بالا با خلوص بالا تولید گردند و با استفاده از واکنشهای ساده شیمیایی آنها را اصلاح نمود، بنابراین آپتامرها قدرت زیادی در طیف وسیعی از کاربردها را دارند. بعلاوه آپتامرها مواد غیرسمی و غیر ایمنی زا هستند که می توانند در پزشکی در زمینه های تشخیصی و درمان بیماریها، دارو، تصویربرداری زیستی بکار روند. امروزه روشهای SELEX متنوع طراحی شده تا اهداف با سرعت و دقت بیشتری آپتامرها را انتخاب کنند.

تکنولوژی آپتامر بعنوان یک تکنولوژی معتبر و موثر گسترش یافته و مطالعات زیادی از کاربردهای آپتامرها انجام گرفته است و امروزه آپتامرها در جنبه های مختلف بعنوان یک ابزار تشخیصی و درمانی، در گسترش داروهای جدید و سیستمهای تحویل دارو بکار می روند. با این وجود آپتامرها هنوز جایگاه خود را در زمینه درمان و تشخیص پزشکی پیدا نکرده است.

البته آپتامرها هنوز چالشها و محدودیتهایی را پیش روی خود دارند. امید است که در آینده ای نزدیک هزینه های سنتز کاهش و خصوصیات فارماکوکیتیک افزایش یابد تا کارایی آپتامرها افزایش یافته و همچنین بر دیگر محدودیتهای آن فائق آیند.

برای کم کردن سرعت کلیرانس کلیوی و افزایش نیمه عمر در گردش آپتامرها استفاده می شود (۶۰).

زمانیکه آپتامرهای اصلاح نشده وارد سلول می شود به سرعت توسط نوکلئازها تجزیه شده و نوکلئوزیدهای حاصل متابولیزه میگردند. نیمه عمر آپتامرها در خون به کوتاهی ۲ دقیقه است که با اصلاحاتی در قسمت قندی یا اتصالات فسفودی استری می توان آنرا افزایش داد (۱۸). رایجترین اصلاحات مربوط به نوکلئوتیدهایی با گروه های فلور یا O-متیل در موقعیت ۲ قند است، این اصلاحات پروفایل فارماکوکینتیکی آپتامرها در بدن را افزایش می دهد (۱۸).

اطلاعات محدودی در مورد سمیت آپتامرها در دسترس است. Macugen و آپتامر ضدسرطان AS1411 سمیت کمی را نشان داده اند (۶۰). با توجه به اینکه آپتامرها سمیت یکسانی ایجاد نمی کنند، برای داشتن آپتامر درمانی، دانستن میزان سمیت آنها ضروریست. اثرات سمیتی که آپتامرها می توانند ایجاد کنند شامل تحریک ایمنی ذاتی و تجمع بافتی الیگونوکلیوتیدها و اثرات پلی آنیونی است. در واقع بعد از چند بار تزریق، آپتامرها در داخل بافت تجمع می یابند و تشکیل گرانولهای بازوفیل را می دهند. البته این گرانول ها تا زمانیکه خیلی زیاد نشده باشند اثرات سویی نخواهند داشت. تجمع بیش از حد گرانولها باعث آسیب غشا و تخریب ارگان می گردد. از عوارض دیگر سمیت می توان به کاهش حجم RBC در تزریقات مداوم آپتامر اشاره کرد (۶۰). بنابراین برای ارائه آپتامر با سمیت کمتر نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

با افزایش رشد بازار برای آپتامر، تقاضای فراوانی برای تولید آپتامرها با قیمت مناسب و با کیفیت ایجاد شده است. محصول بیشتر، خلوص بالاتر و قیمت کمتر از مولفه های اصلی است. چالش مهم دیگر اینست که معمولاً بعد از اعمال اصلاحات طی فرایند تولید باید کنترل روی کیفیت محصول نهایی باشد و برخی از این اصلاحات ممکن است باعث ناپایدار شدن محصول شود

inhibit human thrombin. *Nature* 1992;355:564-566.

9. Borghouts C, Kunz C, Groner B. Peptide aptamers: recent developments for cancer therapy. *Biol. Ther* 2005;5:783-797.

10. Cdk CD. Genetic selection of peptide aptamers that recognize and inhibit cyclin-dependent kinase 2. *Nature* 1996;380:11.

11. Bunka DHJ, Stockley PG. Aptamers come of age“at last. *Nature Reviews Microbiology* 2006;4(8):588-96.

12. Mascini M. Aptamers and their applications. *Analytical and bioanalytical chemistry* 2008;390:987-988.

13. Birch JR, Racher AJ. Antibody production. *Advanced drug delivery reviews* 2006;58(5):671-85.

14. Ferreira CSM, Missailidis S. Aptamer-based therapeutics and their potential in radiopharmaceutical design. *Brazilian archives of biology and technology* 2007;50(SPE):63-76.

15. Jayasena SD. Aptamers: an emerging class of molecules that rival antibodies in diagnostics. *Clinical chemistry* 1999;45(9):1628-50.

16. Ireson CR, Kelland LR. Discovery and development of anticancer aptamers. *Molecular cancer therapeutics* 2006;5(12):2957-62.

17. Eyetech Study G. Preclinical and phase 1A clinical evaluation of an anti-VEGF pegylated aptamer (EYE001) for the

منابع

1. Dollins CM, Nair S, Sullenger BA. Aptamers in immunotherapy. *Human gene therapy* 2008;19(5):443-50.

2. Sullenger BA, Gallardo HF, Ungers GE, Gilboa E. Overexpression of TAR sequences renders cells resistant to human immunodeficiency virus replication. *Cell* 1990;63(3):601-8.

3. O'Malley RP, Mariano TM, Siekierka J, Mathews MB. A mechanism for the control of protein synthesis by adenovirus VA RNA I. *Cell* 1986;44(3):391-400.

4. Ellington AD, Szostak JW. In vitro selection of RNA molecules that bind specific ligands. *Nature* 1990;346(6287):818-22.

5. Tuerk C, Gold L. Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. *Science* 1990;249(4968):505-10.

6. Han K, Liang Z, Zhou N. Design strategies for aptamer-based biosensors. *Sensors* 2010;10(5):4541-57.

7. Lin Y, Qiu Q, Gill SC, Jayasena SD. Modified RNA sequence pools for in vitro selection. *Nucleic acids research* 1994;22(24):5229-34.

8. Bock LC, Griffin LC, Latham JA, Vermaas EH, Toole JJ. Selection of single-stranded DNA molecules that bind and

24. Krieg AM. Therapeutic potential of Toll-like receptor 9 activation. *Nature Reviews Drug Discovery* 2006;5(6):471-84.
25. Krieg AM. Toll-like receptor 9 (TLR9) agonists in the treatment of cancer. *Oncogene* 2008;27(2):161-7.
26. Sheehan JP, Lan H-C. Phosphorothioate oligonucleotides inhibit the intrinsic tenase complex. *Blood* 1998;92(5):1617-25.
27. Keefe AD, Pai S, Ellington A. Aptamers as therapeutics. *Nature Reviews Drug Discovery* 2010; 9(7):537-50.
28. Khati M, SchÄ¼man M, Ibrahim J, Sattentau Q, Gordon S, James W. Neutralization of infectivity of diverse R5 clinical isolates of human immunodeficiency virus type 1 by gp120-binding 20 F-RNA aptamers. *Journal of virology* 2003;77(23):12692-8.
29. Ruckman J, Green LS, Beeson J, Waugh S, Gillette WL, Henninger DD, et al. 20 Fluoropyrimidine RNA-based aptamers to the 165-amino acid form of vascular endothelial growth factor (VEGF165) Inhibition of receptor binding and VEGF-induced vascular permeability through interactions requiring the exon 7-encoded domain. *Journal of Biological Chemistry* 1998;273(32):20556-67.
30. Kaur G, Roy I. Therapeutic applications of aptamers. *Expert Opin Investig Drugs* 2008;17:43-60.
- treatment of exudative age-related macular degeneration. *Retina* 2002;22(2):143-52.
18. Keefe AD, Cloud ST. SELEX with modified nucleotides. *Current opinion in chemical biology* 2008;12(4):448-56.
19. Lee J, Jucker F, Pardi A. Imino proton exchange rates imply an induced-fit binding mechanism for the VEGF165-targeting aptamer, Macugen *Curr Opin Mol Ther* 2009;11:707-15.
20. Becker RC, Chan MY. REG-1, a regimen comprising RB-006, a Factor IXa antagonist, and its oligonucleotide active control agent RB-007 for the potential treatment of arterial thrombosis. *Current opinion in molecular therapeutics* 2009; 11: 707-715.
21. Bates PJ, Laber DA, Miller DM, Thomas SD, Trent JO. Discovery and development of the G-rich oligonucleotide AS1411 as a novel treatment for cancer. *Experimental and molecular pathology* 2009;86(3):151-64.
22. Bates PJ, Kahlon JB, Thomas SD, Trent JO, Miller DM. Antiproliferative activity of G-rich oligonucleotides correlates with protein binding. *Journal of Biological Chemistry* 1999;274(37):26369-77.
23. Teng Y, Girvan AC, Casson LK, Pierce WM, Qian M, Thomas SD, et al. AS1411 alters the localization of a complex containing protein arginine methyltransferase 5 and nucleolin. *Cancer research* 2007;67(21):10491-500.

38. Lee KY, Kang H, Ryu SH, Lee DS, Lee JH, Kim S. Bioimaging of nucleolin aptamer-containing 5-(N-benzylcarboxamide) 20-deoxyuridine more capable of specific binding to targets in cancer cells. *BioMed Research International* 2010;1:9.
39. Kang A, Ku J. Simultaneous electrochemical detection of both PSMA (+) and PSMA (-) prostate cancer cells using an RNA/peptide dual-aptamer probe. *Chemical Communications* 2010;46(30):5566-8.
40. Shin S, Kim I-H, Kang W, Yang JK, Hah SS. An alternative to Western blot analysis using RNA aptamer-functionalized quantum dots. *Bioorganic & medicinal chemistry letters* 2010;20(11):3322-5.
41. Romig TS, Bell C, Drolet DW. Aptamer affinity chromatography:: combinatorial chemistry applied to protein purification. *Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications* 1999;731(2):275-84.
42. Zhao Q, Li XF, Shao Y, Le XC. Aptamer-based affinity chromatographic assays for thrombin. *Anal Chem* 2008;80:7586-93.
43. Jones S, Daley DTA, Luscombe NM, Berman HM, Thornton JM. Protein-RNA interactions: a structural analysis. *Nucleic acids research* 2001;29(4):943-54.
44. Jones S, van Heyningen P, Berman HM, Thornton JM. Protein-DNA
31. Lupold SE, Hicke BJ, Lin Y, Coffey DS. Identification and characterization of nuclease-stabilized RNA molecules that bind human prostate cancer cells via the prostate-specific membrane antigen. *Cancer research* 2002;62:4029-4033
32. Abbasalipourkabir R, Salehzadeh A, Abdullah R. Solid lipid nanoparticles as new drug delivery system. *International Journal of Biothechnology and Molecular Biology Research* 2011;13:252-61.
33. Abbasalipourkabir R, Rasedeeb A, Wunb HC. Characterization of surface-modified nanostructured lipid carriers as colloidal carrier system 2011;44(13):S76.
34. Abbasalipourkabir R, Salehzadeh A, Abdullah R. Antitumor activity of tamoxifen loaded solid lipid nanoparticles on induced mammary tumor gland in Sprague-Dawley rats. *Afr J Biotech* 2010;9(43):7337-45.
35. Abbasalipourkabir R, Salehzadeh A, Abdullah R. Delivering tamoxifen within solid lipid nanoparticles. *Pharmaceutical Technology* 2011;35(4):74-9.
36. Chu TC, Twu KY, Ellington AD, Levy M. Aptamer mediated siRNA delivery. *Nucleic acids research* 2006;34(10):e37.
37. Bagalkot V, Zhang L, Levy-Nissenbaum E, Jon S, Kantoff PW, Langer R, et al. Quantum dot-aptamer conjugates for synchronous cancer imaging, therapy, and sensing of drug delivery based on bi-fluorescence resonance energy transfer. *Nano Letters* 2007;7(10):3065-70.

53. Mendonsa SD, Bowser MT. In vitro selection of aptamers with affinity for neuropeptide Y using capillary electrophoresis. *Journal of the American Chemical Society* 2005;127(26):9382-3.
54. Mendonsa SD, Bowser MT. In vitro selection of high-affinity DNA ligands for human IgE using capillary electrophoresis. *Analytical chemistry* 2004;76(18):5387-92.
55. Kunii T, Ogura S-i, Mie M, Kobatake E. Selection of DNA aptamers recognizing small cell lung cancer using living cell-SELEX. *Analyst* 2011;136(7):1310-2.
56. Daniels DA, Chen H, Hicke BJ, Swiderek KM, Gold L. A tenascin-C aptamer identified by tumor cell SELEX: systematic evolution of ligands by exponential enrichment. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2003;100(26):15416-21.
57. Guthold M, Cubicciotti R, Superfine R, Taylor RM. Novel methodology to detect, isolate, amplify and characterize single aptamer molecules with desirable target-binding properties. *Biophys J* 2002;82:163A-1163A.
58. Tsai RYL, Reed RR. Identification of DNA recognition sequences and protein interaction domains of the multiple-Zn-finger protein Roaz. *Molecular and cellular biology* 1998;18(11):6447-56.
59. Misono TS, Kumar PKR. Selection of RNA aptamers against human influenza interactions: a structural analysis. *Journal of molecular biology* 1999;287(5):877-96.
45. Bunka DHJ, Platonova O, Stockley PG. Development of aptamer therapeutics. *Current opinion in pharmacology* 2010;10(5):557-62.
46. Ruckman J, Gold L, Stephens A, Janjic N. Nucleic acid ligands to integrins. *Google Patents*; 2006. US20020150536 A1.
47. Syed MA, Pervaiz S. Advances in aptamers. *Oligonucleotides* 2010;20(5):215-24.
48. Pristoupil TI, KramlovÄf M. Microchromatographic separation of ribonucleic acids from proteins on nitrocellulose membranes. *Journal of chromatography* 1968;32(4):769.
49. Song K-M, Cho M, Jo H, Min K, Jeon SH, Kim T, et al. Gold nanoparticle-based colorimetric detection of kanamycin using a DNA aptamer. *Analytical biochemistry* 2011;415(2):175-81.
50. Vianini E, Palumbo M, Gatto B. In vitro selection of DNA aptamers that bind L-tyrosinamide. *Bioorganic & medicinal chemistry* 2001;9(10):2543-8.
51. Lévesque D, Beaudoin JD, Roy S, Perreault JP. In vitro selection and characterization of RNA aptamers binding thyroxine hormone. *Biochem J* 2007;403(1):129-38.
52. Gopinath SCB. Methods developed for SELEX. *Analytical and bioanalytical chemistry* 2007;387(1):171-82.

61. Farman CA, Kornbrust DJ. Oligodeoxynucleotide studies in primates: antisense and immune stimulatory indications. *Toxicologic pathology* 2003;31(1 suppl):119-22.
60. Bouchard PR, Hutabarat RM, Thompson KM. Discovery and development of therapeutic aptamers. *Annual review of pharmacology and toxicology* 2010;50:237-57.
- virus hemagglutinin using surface plasmon resonance. *Analytical biochemistry* 2005;342(2):312-7.

جدول ۱: مزایا و محدودیتهای آپتامرها

محدودیتهای آپتامرها:	مزایای آپتامرها:
<p>۱. خصوصیات فارماکوکینتیک آپتامرها معمولا متغیر و غیر قابل پیش بینی است.</p> <p>۲. اندازه کوچکشان آنها را مستعد فیلتراسیون کلیوی کرده و نیمه عمر شان را کوتاه تر می کند.</p> <p>۳. آپتامرهای اصلاح نشده مستعد تجزیه شدن در سرم هستند.</p> <p>۴. تکنولوژی تولید آپتامرها در انحصار چند شرکت محدود است.</p>	<p>۱. آپتامرها در فرایندهای شیمیایی ساده در مقادیر زیاد قابل تولید هستند.</p> <p>۲. فرایندهای شیمیایی تولیدی، مستعد آلودگی های ویروسی و باکتریایی نمی باشد.</p> <p>۳. ایمنی زا نیستند.</p> <p>۴. اندازه کوچکشان اجازه ورود به بسیاری از بخشهای بیولوژیکی را میدهد.</p> <p>۵. توانایی انتخاب علیه اهداف خاص و یا انتخاب علیه اهداف سطحی سلولی را دارند.</p> <p>۶. معمولا بطور برگشت پذیر دنا توره می شوند و باند فسفودی استر بسیار پایدار است.</p> <p>۷. تغییرات شیمیایی هنگام افزودن گروه های کاربردی و رنگی معمولا بر فعالیتشان تاثیر گذار نیست.</p>

جدول ۲: لیستی از آپتامرهای درمانی

آپتامر	شرایط بیماری	هدف	فاز بالینی
ARC1905	Age-related macular degeneration	فاکتور C5 آبشار کمپلمان	فاز ۱
AS1411	لوکمی حاد میلوئید	نوکلئوبین	فاز ۲
E10030 plus Lucentis	Age-related macular degeneration	فاکتور رشد مشتق از پلاکت	فاز ۲
NOX-A12	پیوند سلول بنیادی	SDF-1	فاز ۱
NOX-E36	دیابت نوع ۲	MCP-1	فاز ۱
NU172	بیماری قلبی	الفا ترومبین	فاز ۲
Pegaptanib/Macugen	Age-related macular degeneration	فاکتور رشد مشتق از پلاکت	فاز ۴
REG1	بیماری قلبی عروقی	مهارگر فاکتور a11	فاز ۲

Aptamers and their biological-therapeutical applications: A review article

Abstract:

Aptamers are the artificial single-stranded DNA or RNA sequences (more recently, peptides) that fold into secondary and tertiary structures making them bind to certain targets with extremely high specificity. Aptamers were reported for the first time in 1990, a number of their unique features make them a more effective choice than antibodies. Aptamers typically generated through Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment (SELEX) and screened and selected via in vitro process from a library, making it possible to attach to any target molecules (from small inorganic ions to intact cells). Also, aptamers, once selected, can undergo subsequent amplification through Polymerase Chain Reaction (PCR) to produce a large quantity with high purity. The simple chemical structure of aptamer makes it easily amendable to further functional modifications according to different purposes. Finally, aptamers are much more stable than antibodies, making them suitable in applications requiring harsh conditions (e.g., high temperature). The increasing studies and explorations in the fields of diagnostics and therapeutics are running. It is likely that in the near future, aptamers will increasingly find use in concert with other therapeutic molecules.

In the current review article, the reasons why aptamers are known as alternatives to antibodies are presented. Furthermore, various applications of aptamers including diagnostics, therapeutics, molecular imaging and drug delivery were introduced. Several types of in vitro selection processes are explained in detail.

Key words: *Aptamer, Antibody, Drug Delivery system, Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment (SELEX).*